



## Nejčastější odrůdy česneku



Zahradka Dubečno

paličáky	výsadba		vegetační doba	sklizeň	vlastnosti
	podzim	jaro			
Bjetin	*		raný	začátek července	vhodný pro sklizeň na zeleno; nedráždí žlučník
Blanin II	*		polopozdní	cca do 25. července	vysoká skladovatelnost; je nejméně napadán houbomilkou česnekovou
Džambul	*		poloraný	kolem 15. července	velmi výnosná a vysoce skladovatelná odrůda
Havel	*		polopozdní	kolem 20. července	velmi výnosná velkostroužková odrůda
Havran	*		polopozdní	kolem 20. července	velkostroužková odrůda
Ivan	*		poloraný	kolem 15. července	maxi paličák s vysokým výnosem
Jovan	*		polopozdní	cca do 25. července	jedna z nejstarších českých odrůd; velkostroužková odrůda
Karel IV.	*		polopozdní	kolem 20. července	vysoká skladovatelnost; velkostroužková odrůda
Mirka	*	*	polopozdní	kolem 25. července	vysoká skladovatelnost
Slavin II	*		polopozdní	kolem 20. července	výnosná odrůda s podlouhlým tvarem stroužků
Stanik	*		polopozdní	kolem 25. července	velmi ostrá odrůda; vysoká skladovatelnost
Vekan	*		raný	do 10. července	do nižších i horských poloh; dobře snáší vysokou hladinu spodní vody
<b>nepaličáky</b>					
Anton	*		raný	začátek července	vhodný pro sklizeň na zeleno
Benátčan	*	*	pozdní	začátek srpna	vysoká skladovatelnost (až 24 měsíců); při opoždění sklizně se nerozpadá
Japo II	*	*	pozdní	začátek srpna	při opoždění sklizně se nerozpadá; jedna z nejchutnějších odrůd
Lukan	*		raný	do 10. července	dobře snáší vysokou hladinu spodní vody; velmi výnosná a spolehlivá odrůda
Matin	*	*	polopozdní	kolem 20. července	vysoká skladovatelnost
Štěpán	*		poloraný	kolem 10. července	nevhodné jsou zamokřené, silně utužené a chladné půdy
Záhorský II	*		raný	do 10. července	výnosná a spolehlivá odrůda