


JAK NA ÚSPĚŠNÝ VÝSEV SEMÍNEK






TŘI PILÍŘE ÚSPĚŠNÉHO VÝSEVU


- Dobré načasování
- Dostatek vláhy
- Správná teplota před a po



1. Dobré načasování


- respektujte instrukce na obalu se semínky
- u zeleniny si stanovte datum výsadby a odpočítejte vhodný termín výsevu
- zvažte své časové a prostorové možnosti





Respektujte instrukce na obalu se semínky


CO NAJDETE NA OBALU - VÝZNAM PIKTOGRAMŮ:



výsev do vytápěných
prostor (skleník, byt
atd.)




nevhodný způsob
výsevu




výsev přímo na
záhon




běžně nedoporučený
způsob výsevu možný
pouze za vhodných
podmínek




pěstování
ve vytápěných
rychlírnách




raději nepřesazovat




pěstování
v nevytápěných
rychlírnách



doporučený spon
pěstování



termín výsadby
na venkovní záhon




obvyklý termín
sklizně

CUOR DI BUE

Rajče tyčkové
Rajčiak kolíkový
Solanum lycopersicum L.

„býčí srdce“



výsev do vytápěných
prostor (skleník, byt atd.);
někdy se v cm uvádí
hloubka výsevu
březen až duben

výsadba do nevytápěných
prostor (fóliák atd.)
duben


termín výsadby
na venkovní záhon
květen

doporučený spon
pěstování
**řádky 80 cm od sebe,
rostliny v řádku 40
cm od sebe**

obvyklý
termín
sklizeně
**od července
do října**


prerostle. Vysejte. Ne každá sazenička přežije. Semínka rajčat potřebují k vyklíčení teplo. Semínko musí vyklíčit. Při nižších teplotách se snižuje klíčivost a semena nemusí vyklíčit vůbec! Optimálně 25 °C. Vysejte nejprve do jedné nádobky do výsevního substrátu do hloubky max. 5 mm. Pravidelně zavlažujte. Substrát nesmí vyschnout. Vyklíčené semenáčky umístěte na co nejlépe prosvětlené místo (okno, skleník). V tomto stádiu již nižší teplota kolem 15 °C nevadí. Semenáčky ve stádiu prvních či druhých dvou pravých lístků přepíchejte do samostatných kelímků. Vyhněte se platům od vajec a rolím od toaletního papíru, protože ve vlhku mohou plesnivět. Dejte pozor, abyste semenáčky neutopili příliš hluboko pod okrajem kelímku, kde by neměly dost světla. Ven vysadte v druhé polovině května, kdy je riziko přizemních mrazíků minimální, ve vyšších polohách až v červnu. Mráz rajčata spálí. Před výsadbou doporučujeme sazenice asi týden otužovat, aby se aklimatizovaly venkovním podmínkám. Zejména přímému slunci je důležité vystavovat je postupně. První den např. hodinu a další dny expozici venkovním podmínkám prodlužovat. Předejdete tak popálení sluncem, které často poškodí sazenice předpěstované doma. Tyčková rajčata se pěstují na jeden hlavní výhon, který je třeba vyvazovat k opoře. Boční výhony (tzv. zálistky) se pravidelně každý týden vylamují. Zdravé listy nevylamujte, rostlina je potřebuje k fotosyntéze. Pod tyčkovými rajčaty můžete pěstovat listovou zeleninu, která dobře snáší částečný zástín: salát, šruchu (portulák), mangold či roketu.

Výsev doma: 03–04 | Výsadba ven: 05–06 | Přímý výsev: Ne | Spon: 100 x 50 cm
Poloha: Plné slunce | Klíčivost: 93 % (testováno 10/2022)
Optim. teplota pro klíčení: 25 °C



U zeleniny si stanovte datum výsadby a odpočítejte vhodný termín výsevu

Nedostatek světla má za následek vytahování semenáčků do výšky (za světlem), řídké pletivo, sazenice ztrácí na vitalitě a tudíž i na odolnosti proti škůdcům.



CO NA OBALU NENAJDETE:

Paprika.....výsev 12 týdnů před výsadbou

Rajče.....výsev 8-9 týdnů před výsadbou

Tykve.....výsev 2-3 týdny před výsadbou


Okurky.....výsev 2-3 týdny před výsadbou

17. - 24. 3.

8 - 9 týdnů

19. 5.

Lépe vysévat o týden později, než o týden dříve!!!



Zvažte své časové a prostorové možnosti

- Pokud začínáte, nepřehražte to s množstvím, může se stát, že **všechna klíčící semínka neuhlídáte** a byla by to škoda.
- Pamatujte, že vás čeká 2 měsíční období **každodenní péče** nebo alespoň kontroly, zda mají rostlinky všechno, co potřebují.
- Myslete na to, že až jednotlivé **semenáčky přepícháte**, budete potřebovat o hodně víc místa s dostatkem světla.



2. Dostatek vláhy ...ale ne moc

- Po vysetí provedte **první závlahu pomocí rozprašovače**, abyste semínka ze substrátu nevyplavila
- Výsevní substrát by **až do vyklíčení neměl vyschnout!!!**



3. Správná teplota před a po



Teplota potřebná k **vyklíčení** bývá někdy jiná než teplota vhodná k růstu semenáčků!!!



Při příliš nízké teplotě po výsevu

- semínka nevyklíčí vůbec
- semínka vyklíčí po delší době, než je běžné





Při příliš vysoké teplotě po vyklíčení

- se sazenice **vytahují do výšky** (obzvlášť v kombinaci s nedostatkem světla)



Příklad některých plodin s rozdílnými potřebami teplot

	PŘED VYKLÍČENÍM:	PO VYKLÍČENÍ:
Papriky	25 – 30 °C	20 °C
Rajče jedlé	25 °C	20 °C
Rajče divoké	27– 29 °C den/18 °C noc	pokojová teplota
Tykve	20 – 24 °C	pokojová teplota
Okurky	26 – 30 °C	pokojová teplota
Meloun	25 – 28 °C	pokojová teplota

Pokud semínka nevyklíčí, co může být špatně?

- špatná hloubkou výsevu
- nedostatečná nebo přílišná zvlaha
- příliš nízká teplota potřebná k vyklíčení
- velmi nízká klíčivost semen (expirace, špatné skladování, poškození)
- nedostatek světla



kde najdete další dávku inspirace:



www.chaloupkadubecno.cz/blog



[Rajčatový manuál](#)

Průvodce pěstováním rajčat od semínka po sklizeň



[Základní vytrvalé bylinky do vaší zahrady i kuchyně](#)

Jak vypěstovat nenáročné bylinky a jak je využít